



Grandes  
Cultures

# Avertissements<sup>®</sup> agricoles auvergne

Bulletin technique N° 10 du 09/06/1997



## BLE

**Pucerons des épis :** Pullulation localement. Intervenir si nécessaire.

**Maladies :** Evolution lente de la septoriose.

## TOURNESOL

**Phomopsis :** Absence de risque.

**Pucerons :** A surveiller.

**Mildiou :** A surveiller.

## BLE

**Stades :** Fin floraison ( 10-5-3 ) à début amande aqueuse ( 10-5-4 )

### Maladies

Progression lente de la septoriose vers les étages supérieurs et rouille brune très rare . Fin de période de risque.

### Pucerons des épis( *Sitobion avenae* )

**Attention :** une multiplication sérieuse des colonies de pucerons des épis s'est opérée depuis quelques jours. Le seuil d'intervention est même parfois dépassé.

Une grande variabilité entre parcelles est observée. Les variétés de blé " non barbuées " sont souvent les plus concernées. Les insectes auxiliaires sont encore peu nombreux.

Soyez très vigilant. Observez vos parcelles souvent et régulièrement jusqu'au stade **grain laiteux-pâteux**. La multiplication peut être très rapide.

**Intervenez uniquement si le seuil de 50% des épis infestés est atteint en utilisant un aphicide homologué.** Consulter le dépliant vert " insecticides céréales ".

## TOURNESOL

**Stades :** variables et hétérogènes : 2-4 feuilles à 6-8 paires de feuilles.

### Pucerons

Infestations faibles dans l'ensemble.

Publication mensuelle  
Abonnement annuel : 300 Frs  
Chèques : Régie de recette D. R. A. F.  
Imprimerie D. R. A. F.

D.R.A.F. Service Régional  
de la Protection des Végétaux  
Marmilhat B.P. 45 - 63370 LEMPDES  
Tél : 04.73.42.14.83 - Fax : 04.73.90.83.70



4036  
47845

23



746

Surveillez vos parcelles surtout les plus tardives afin d'intervenir au seuil.

Seuils : Avant B5 : 30 à 50 pucerons / plantes  
Entre B5 et E1 : 50 à 100 pucerons / plantes.

### Phomopsis

Maturation des périthèces de l'ordre de 30 à 40%.

Asques bien différenciés à l'observation en laboratoire.

Absence de risque pour l'instant. Attendre nos indications.

### Mildiou

Bien observer vos parcelles pour détecter les éventuels symptômes. Prévenir le SRPV en cas d'attaque avec nanisme important.

